

#WDAD2021



هل تعلم...

أنَّ اليوم العالمي للتوعية بمرض الدوشين هو يوم 7.9 لأن جين الديستروفين المرتبط بالمرض يتكون من 79 إكسونًا (قطعة).

WORLD DUCHENNE DAY .ORG

#WDAD2021



هل تعلم...

أنَّ الجين الذي يشفر بروتين الديستروفين
ويرتبط بمرض الدوشين بيكر هو أطول جين
معروف عند البشر.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2021



هل تعلم...

أنه من المهم أن تعرف بالضبط العيب الوراثي في أي طفرة، لأن بعض العلاجات الجديدة تطابق طفرات محددة.

WORLDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2021



هل تعلم...

أنَّ عدم وجود الدستروفين يسبب
ضرراً لخلايا العضلات.

بمرور الوقت، تتبدل الأنسجة العضلية
بأنسجة ندبية ودهون.

WORLDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2021



هل تعلم...

أن بروتين الديستروفين الناقص
في العضلة ويسبب تدميرها ،
ناقص في الدماغ أيضًا.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2021



هل تعلم...

بفضل المعيار الحالي لعلاج المرض،
يمكن لمرضى الدوشين العيش حتى بداية
العقد الرابع من حياتهم وما بعده.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2021



هل تعلم...

يرمز البالون الأحمر إلى اليوم العالمي
للتوعية بالدوشين بيكر منذ بدايته لأول
مرة، في عام 2014.

WORLD DUCHENNE DAY .ORG

#WDAD2021



هل تعلم...

أنه في كل عام، يولد 1 من بين
كل 5,000 طفل مع مرض ضمور
العضلات دوشين.

غالبًا، سيتمّ تشخيص المرض لاحقًا.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2021



هل تعلم...

أنّ نقص الوعي للدوشين بيكر
بين المتخصّصين في مختلف مجالات العلاج
هو سبب هامّ للتأخّر في التشخيص.

WORLD DUCHENNE DAY .ORG

#WDAD2021



هل تعلم...

أن متوسط العمر عند التشخيص هو 4.5 سنة وأن الأهل يلاحظون علامات المرض في سن مبكرة، عندما يكون الأطفال صغارًا جدًا.

WORLD DUCHENNE DAY .ORG

#WDAD2021



هل تعلم...

أنّ الطفرة في جين الديرروفين يمكن
أن تنتقل من الأم، أو تحدث تلقائيًا.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG

#WDAD2021



هل تعلم...

أنَّ امرأة مع تغيير وراثي في واحد من اثنين
من الكروموسومات X عندها تعتبر "ناقلة"
لمرض الدوشين / بيكر.

WORLD DUCHENNE DAY .ORG

#WDAD2021



هل تعلم...

أنَّ فحصًا وراثيًا يؤكِّد تشخيص
الدوشين / بيكر ويشير إلى الموقع الدقيق
للطفرة في الجين.

WORLD DUCHENNE DAY .ORG

#WDAD2021



هل تعلم...

أنّ لدى مرضى ضمور العضلات دوشين
نقصًا كبيرًا في بروتين الدستروفين.

WORLD DUCHENNE DAY .ORG

#WDAD2021



هل تعلم...

أنّ لدى مرضى ضمور العضلات بيكر
مستويات منخفضة من بروتين الديستروفين
أو لديهم بروتين أقصر.

WORLD DUCHENNE DAY .ORG

#WDAD2021



هل تعلم...

أن متوسط المدة لتشخيص مرض ضمور
العضلات دوشين / بيكر
(تأخير في التشخيص) هو عامين ونصف.

WORLD DUCHENNE DAY .ORG

#WDAD2021



هل تعلم...

أن مرض ضمور العضلات دوشين / بيكر
يؤثر على كل شخص بشكل مختلف.
حتى بين الأثقاء، هناك تباين
في تطور المرض.

WORLDDUCHENNEDAY.ORG